



## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach

*Katarzyna Luniewska-Kopacz*

### UWAGA

### ZAGROŻENIE HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach zaleca zachowanie szczególnej ostrożności oraz ściśle przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, w związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną dotyczącą stwierdzenia kolejnych ognisk zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (mewy śmieszki) na terenie województwa podlaskiego oraz licznych ognisk HPAI u ptaków dzikich na terytorium Polski.

W szczególności należy:

1. wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybiegi i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. zapewnić karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
3. przechowywać paszę dla drobiu w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
4. unikać pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
5. używać odzież ochronną oraz obuwie ochronne przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
6. po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi należy umyć ręce wodą z mydłem;
7. stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

W przypadku stwierdzenia objawów klinicznych takich jak:

- 1) zwiększona śmiertelność;
- 2) znaczny spadek pobierania paszy i wody;
- 3) drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchowa,
- 4) duszność, sinica, wybroczyny,
- 5) biegunki lub nagły spadek nieśności,

należy niezwłocznie powiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu powyższych wymienionych objawów u drobiu.

Źródłem zakażenia drobiu domowego jest najczęściej bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w SUWAŁKACH

*Katarzyna Luniewska-Kopacz*