

# Rzekomy pomór drobiu -choroba podlegająca obowiązkowi zwalczania!!!




Objawy nerwowe w przebiegu zakażenia welogenicznym szczepem NDV



Masowe upadki w przebiegu niektórych form ND



Zapalenie spojówek w zakażeniu NDV



Białe skorupy jaj w przebiegu zakażenia welogenicznym szczepem NDV

**Rzekomy pomór drobiu** (choroba Newcastle- ND) stanowi zagrożenie występujące na całym świecie. Ze względu na wysoką śmiertelność sięgającą 100% powoduje ogromne straty ekonomiczne w hodowli drobiu.

Wirus rzekomego pomoru drobiu to RNA-wirus. Roznosi się drogą kropelkową, zarówno przez układ oddechowy jak i pokarmowy.

## Objawy kliniczne

Okres inkubacji wynosi 2-15 dni. Główne objawy to: łzawienie i obrzęk wokół oczu, kaszel, duszność i podwyższone upadki. Zakażenie może negatywnie wpływać na nieśność i jakość jaj (może pojawiać się depigmentacja skorupy). Może wystąpić także skręt szyi, paraliż i krwawa biegunka. Choroba charakteryzuje się wysoką zachorowalnością i śmiertelnością. Choroba występuje częściej w stadach ptaków utrzymywanych w celach hobbyistycznych.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby i strat ekonomicznych jakie powoduje choroba należy stosować zasady bioasekuracji w stadach drobiu, istnieje również możliwość szczepienia ptaków. Szczepi się zarówno jednodniowe pisklęta jak i dorosłe ptaki.